

**Preparaat: Coffeinedrank 10 mg/ml**

**Artikelnummer: 97915335**

**Z-index: 16039882**

---

## **Bijsluiter**

### **Werking en toepassingen**

#### **Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?**

Coffeinedrank 10 mg/ml wordt gebruikt voor de behandeling van onderbroken ademhaling bij te vroeg geboren baby's (primaire apneu bij premature pasgeborenen). Deze korte perioden waarin premature baby's stoppen met ademen, komen doordat hun ademhalingscentra niet volledig zijn ontwikkeld. Coffeïne stimuleert het ademhalingscentrum. Uit onderzoek blijkt dat dit geneesmiddel het aantal episoden van onderbroken ademhaling vermindert bij premature pasgeborenen.

### **Bijwerkingen**

#### **Op welke bijwerkingen moet ik letten?**

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Vaak (bij 1-10%):

- Verhoging van de glucosespiegel in het bloed
- Snelle hartslag
- Ontsteking op de infusieplaats en aderontsteking

Soms (minder dan 1%):

- Overmatige prikkeling van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg bijwerkingen zoals stuiptrekkingen
- Hartritmestoornissen

Zelden treden er overgevoeligheidsreacties op.

Verder zijn bij prematuren gemeld bloedvergiftiging (sepsis), verlaging van de glucosespiegel in het bloed, groeiachterstand, voedingsintolerantie, misselijkheid, braken, slapeloosheid, prikkelbaarheid, nervositeit, rusteloosheid, lichte plotse verwardheid, hersenletsel, doofheid, hartafwijkingen (vergroete uitstroom van de linkerkamer, vergroot slagvolume), hoge bloeddruk, zure oprispingen, ernstige darmaandoening met bloederige ontlasting (necrotiserende enterocolitis), verhoogde urineafdrijving, stijging van natrium en calcium in de urine, verlaging van hemoglobine in het bloed en een daling van thyroxine in het bloed.

Raadpleeg uw apotheker of arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

### **Hoe, wanneer en hoelang?**

#### **Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?**

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. De arts van uw baby schrijft de juiste hoeveelheid coffeinedrank voor op basis van het gewicht van uw baby.

### **Wanneer?**

De behandeling met coffeinedrank wordt gestart onder supervisie van een ervaren arts.

**Preparaat: Coffeinedrank 10 mg/ml**

**Artikelnummer: 97915335**

**Z-index: 16039882**

---

### **Hoelang?**

De arts van uw baby bepaalt hoe lang bij uw pasgeborene de behandeling met coffeinedrank moet worden voortgezet.

### **Dosis vergeten of teveel gebruikt?**

#### **Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?**

Mocht u opmerken dat er een dosis is vergeten, neem dan contact op met de arts.

#### **Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?**

Uw pasgeborene kan onder andere last krijgen van misselijkheid, braken, buikpijn, hoofdpijn, een toename in plassen, snelle hartslag, verhoging van de glucosespiegel in het bloed, spierbevingen en spiertrekkingen als er meer cafeïne wordt ingenomen dan toegestaan. Wanneer u deze symptomen herkent bij uw baby, neem dan direct contact op met de arts.

### **Autorijden, alcohol, voeding**

#### **Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?**

Gezien de toepassing van dit geneesmiddel is deze rubriek niet van toepassing.

#### **Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?**

Gezien de toepassing van dit geneesmiddel is deze rubriek niet van toepassing.

#### **Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?**

Gezien de toepassing van dit geneesmiddel is deze rubriek niet van toepassing.

### **Wisselwerking**

#### **Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?**

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

- theofylline (gebruikt voor de behandeling van longziekten)
- doxapram (gebruikt voor de behandeling van longziekten)
- fenobarbital (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)
- fenytoïne (gebruikt voor de behandeling van epilepsie)
- methotrexaat (gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis)

De arts moet mogelijk de dosering aanpassen of één van de geneesmiddelen vervangen. Cafeïne kan de kans op ernstige darmaandoeningen met bloederige ontlasting (necrotiserende enterocolitis) vergroten, wanneer het wordt toegediend in combinatie met maagzuurremmers.

Twijfelt u eraan of één van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

#### **Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil**

**Preparaat: Coffeinedrank 10 mg/ml**

**Artikelnummer: 97915335**

**Z-index: 16039882**

---

**worden? Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?**

Als de baby borstvoeding krijgt terwijl hij/zij met coffeinedrank wordt behandeld, mag de moeder geen koffie drinken of andere producten gebruiken waarin veel cafeïne (gelijk aan cafeïne) zit, denk hierbij aan (grote hoeveelheden) thee, cola en energiedranken. Cafeïne gaat namelijk over in de moedermelk.

**Wanneer niet gebruiken?**

**Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?**

U mag dit middel niet gebruiken:

- Wanneer uw pasgeborene allergisch is voor één van de stoffen in de coffeinedrank. Een lijst van de stoffen die in deze drank zijn verwerkt, kunt u vinden in de bijsluiters onder het kopje 'samenstelling'.

Als u twijfelt of de bovenstaande situatie op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

**Stoppen**

**Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?**

De arts van uw baby bepaalt wanneer het gebruik van de coffeinedrank gestopt kan worden.

**Samenstelling**

**Wat zit er in dit medicijn?**

Het werkzame bestanddeel van deze drank is cafeïne. Per milliliter bevat deze drank 10 milligram cafeïne. Daarnaast bevat de drank de hulpstoffen methylparahydroxybenzoaat en gedestilleerd water.

**Bewaren**

**Hoe moet ik het medicijn bewaren?**

Coffeinedrank 10mg/ml is als ongeopende verpakking 1 jaar houdbaar. Na openen kan de drank nog 1 maand bewaard worden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en ze komen niet in het milieu.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst