

Begrippenlijst

Apneu

Apneu is het stokken van de ademhaling. Het komt regelmatig voor bij te vroeg geboren kinderen, als gevolg van onrijpheid van de hersenen.

Arteriële lijn

Een arteriële lijn is een infuus in een slagader, meestal in de pols of via de navel. Via deze lijn kan de bloeddruk gemeten worden en kunnen we bloed afnemen. Uw baby hoeft dan niet extra geprikt te worden.

Beademing

Een beademingsapparaat ondersteunt de ademhaling van het kind of neemt de ademhaling helemaal over. HFO-beademing is een speciale vorm van beademing die werkt met trillingen.

Bradycardie

Bradycardie is een te lage hartslag. Dit kan voorkomen in combinatie met apneu.

CPAP

Dit apparaat ondersteunt de ademhaling van het kind door lucht en eventueel extra zuurstof in de longen te blazen. Dit gebeurt via een kapje of twee korte buisjes in de neus van het kind.

Diepe lijn

Een diepe lijn is een lange infuuslijn die de arts steriel in de navelstreng inbrengt. Vaak gebeurt dit vlak na de geboorte. Een lange infuuslijn kan ook in een bloedvat in een arm of been worden ingebracht.

Dysmatuur

Een kind met een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur wordt dysmatuur genoemd.

Infuus

Veel kinderen op de NICU kunnen nog niet genoeg voeding via hun maag en darmen opnemen. Zij krijgen een infuus: een klein plastic buisje in een bloedvat waardoor continu extra vocht en/of voeding kan worden gegeven. Via het infuus kunnen ook medicijnen worden gegeven.

Low of High-Flow

Via een neusbril, of 'snorretje' wordt verwarmde lucht en/of zuurstof gegeven.

Maagsonde

Een maagsonde is een slangetje door de mond of neus via de slokdarm naar de maag gaat. Zo kunnen ook kinderen die nog niet zelf drinken voeding krijgen.

Monitor

Een apparaat waarop de hartslag, ademhaling, saturatie, bloeddruk en temperatuur van uw kind worden weergegeven.

Prematuur

Een kind dat geboren wordt na een zwangerschapsduur minder dan 37 weken noemen we prematuur. Een kind dat geboren wordt na 32 of minder weken zwangerschap noemen wij ernstig prematuur. Een kind geboren tussen de 24 en 26 weken zwangerschap is extreem prematuur.

Saturatiedaling

Bij een saturatiedaling of cyanose heeft het kind een te laag zuurstofgehalte in het bloed, Dit kan het gevolg zijn van het stokken van de ademhaling of een te lage hartslag. Vaak kan het kind dit zelf oplossen, maar soms is er ondersteuning nodig in de vorm van extra zuurstof.

A Term

Een kind geboren met een zwangerschapsduur van 37 tot 42 weken.

Navellijn

Deze lange infuuslijn wordt steriel door een arts in de navelstreng ingebracht. Vaak gebeurt dit vlak na de geboorte. Een lange infuuslijn kan ook in een bloedvat in een arm of been worden ingebracht.