

Polymyxine B sulfaat/neomycinesulfaat tablet 500.000 IE/125 mg LUMC

Versie: 2.0 Laatste herziening: 25-09-2018 Artikelnummer: 97967203



Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Een polymyxine B-sulfaat/neomycinesulfaat tablet wordt oraal ingenomen en wordt gebruikt bij selectieve darmdecontaminatie (SDD). Selectieve darmdecontaminatie (SDD)-medicatie wordt soms voorgeschreven bij patiënten die een behandeling met intensieve chemotherapie ondergaan, wanneer er verwacht wordt dat de afweer lange tijd verstoord zal zijn. Na een chemotherapie behandeling zal het aantal witte bloedlichaampjes sterk verminderen. Hierdoor ontstaat er een verminderde afweer tegen infecties. In deze periode is de patiënt daardoor vatbaarder voor bacteriën, virussen en schimmels. De bacteriën die in het maag-darmkanaal bij iedereen aanwezig zijn, kunnen bij een verminderde afweer infecties geven. Om te voorkomen dat men ziek wordt van deze bacteriën, wordt voordat men met de chemotherapie start begonnen met SDD-medicatie. Polymyxine en neomycine zijn antibiotica die verschillende soorten bacteriën doden.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

- Overgevoeligheidsreacties
- Anafylaxie (allergische reactie)
- Misselijkheid
- Braken
- Diarree
- Wijziging in de darmflora
- Allergische huidreacties

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?

U kunt het medicijn het best met wat voedsel innemen, u heeft dan de minste kans op maag-darmklachten.

- Als u het medicijn een keer per dag moet gebruiken: bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis.
- Als u het medicijn twee keer per dag moet gebruiken: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het eten.
- Als u het medicijn meer dan twee keer per dag moet gebruiken: verdeel de tijdstippen gelijkmatig over de dag.

Hoelang?

Dit geneesmiddel wordt gedurende enkele dagen of weken gebruikt. Overleg dit met uw arts of apotheker.

Dosis vergeten of teveel gebruikt?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

- Indien minder dan 4 uur zijn verstreken: neem het medicijn alsnog in.

Polymyxine B sulfaat/neomycinesulfaat tablet 500.000 IE/125 mg LUMC

Versie: 2.0 Laatste herziening: 25-09-2018 Artikelnummer: 97967203



- Indien meer dan 4 uur zijn vestreken: sla de gift over en neem de volgende dosis op het normale tijdstip in.

Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen bekend.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen bekend.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen bekend.

Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Van dit medicijn zijn geen wisselwerkingen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?

Polymyxine en neomycine kunnen bij gebruik als selectieve darmdecontaminatie waarschijnlijk veilig gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Overleg dit wel met uw arts of apotheker.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?

Polymyxine en neomycine worden na oraal gebruik nauwelijks geabsorbeerd, en kunnen daarom tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt. Overleg dit met uw arts of apotheker.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken:

- Bij overgevoeligheid of allergie van dit medicijn of voor andere aminoglycosiden of polymyxinen.
- Wanneer u last heeft van darmobstructie (ileus) of uitgebreide zweren in de darm (darmulceraties).

In de volgende gevallen dient u extra voorzichtig te zijn met dit geneesmiddel (meld dit aan uw arts):

- Nierfunctiestoornissen
- Gehoorstoornissen

Als u twijfelt of één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, er kan niet zomaar met dit medicijn gestopt worden. Neem contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in Polymyxine B sulfaat/neomycinesulfaat tablet 500.000 IE/125 mg LUMC zijn polymyxine B-sulfaat 500.000 IE (internationale eenheden) en neomycinesulfaat 125 mg.

De overige stoffen (hulpstoffen) in dit geneesmiddel zijn aardappelzetmeel, magnesiumstearaat, talk en povidon.

Bijsluiter

Polymyxine B sulfaat/neomycinesulfaat tablet 500.000 IE/125 mg LUMC

Versie: 2.0 Laatste herziening: 25-09-2018 Artikelnummer: 97967203



Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Bewaren bij kamertemperatuur beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en ze komen niet in het milieu.

Buiten het zicht en bereik van kinderen.

Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.