

Probenecide capsule 125 mg LUMC

Versie: 1

Laatste herziening: 01-06-2015 Artikelnummer: 97993964

Werking en toepassingen

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Probenecide zorgt dat meer urinezuur met de urine wordt uitgescheiden. Het vermindert daardoor de hoeveelheid urinezuur in het bloed. Het duurt meestal enkele weken voor de hoeveelheid urinezuur in het bloed voldoende is gedaald

als adjuvans bij therapie met cidofovir om nierschade te voorkomen

Bij jicht is sprake van te veel urinezuur in het bloed. Er ontstaan daardoor urinezuur-kristallen in gewrichten. Dit veroorzaakt pijn en ontsteking.

- Dit middel wordt gebruikt om jichtaanvallen te voorkomen.
- Het wordt gebruikt als de andere beschikbare middelen tegen jicht niet gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege overgevoeligheid.
- Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere jichtmiddelen als deze onvoldoende effect hebben.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken. Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. Bijwerkingen kunnen soms optreden bij daarvoor gevoelige personen.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Soms:

- maagdarmlicheten, gebrek aan eetlust. U kunt deze klachten verminderen door de capsules met wat voedsel of tijdens de maaltijd in te nemen.
- vaker aandrang te urineren
- In de eerste weken van de behandeling soms: jichtaanval. Dit zal de arts proberen te voorkomen door de dosering geleidelijk te verhogen of de eerste weken ook een ander middel tegen jicht erbij te gebruiken.

Zelden:

- nierstenen. U kunt de kans hierop verkleinen door tijdens de behandeling veel te drinken: twee tot drie liter vocht per dag. Soms schrijft de arts ook zuiveringszout voor. Dit helpt bij de uitscheiding van urinezuur. Raadpleeg bij bloed in de urine uw arts. Dat kan een verschijnsel zijn van nierstenen. • hoofdpijn, duizeligheid, opvliegingen
- pijnlijk tandvlees

Zeer zelden:

- ernstige bloedafwijking. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare koorts, keelpijn, blaren in de mond, blauwe plekken en erg bleke huid.
- huiduitslag, jeuk of galbulten. Mogelijk bent u overgevoelig voor dit middel. Overleg hierover met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Neem de capsules in met een half glas water. Drink tijdens de behandeling veel: twee tot drie liter per dag. Zo helpt u het lichaam om het overvloedige urinezuur af te voeren en voorkomt u dat nierstenen ontstaan

Probenecide capsule 125 mg LUMC

Versie: 1

Laatste herziening: 01-06-2015 Artikelnummer: 97993964

Wanneer?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Begindosering is meestal 2 keer per dag 2 capsules. Na een week meestal 2 keer per dag 4 capsules. Na enkele weken kan de arts de dosering nog verder verhogen tot maximaal 2 maal per dag 8 capsules.

Hoelang?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosis vergeten of teveel gebruikt?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn sla deze dan over en neem de volgende dosis op het normale tijdstip in.

Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?

Ja, bij dit geneesmiddel zijn hiervoor geen beperkingen.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?

Het drinken van te veel alcohol kan de hoeveelheid urinezuur in het bloed verhogen waardoor probenecide minder goed werkt.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?

Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

- methotrexaat (een middel tegen kanker, reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn): de concentratie kan stijgen.
- De toxiciteit van zidovudine (een middel tegen HIV-infectie) kan toenemen.

Niet beoordeeld:

bij combinatie met allopurinol kan de excretie van de actieve metaboliet oxipurinol worden versneld en de werking van allopurinol afnemen.

Probenecide kan de plasmaconcentratie van zwakke zuren verhogen door remming van de tubulaire secretie. Dit kan van belang zijn bij penicillines, een aantal cefalosporines en verder bij dapson en ketoprofen. De effectiviteit van nitrofurantoïne in de urinewegen kan afnemen.

Twijfelt u eraan of één van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?

Dit middel NIET gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Het is niet bekend of het veilig is voor het ongeboren kind. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een middel dat wel veilig is.

Probenecide capsule 125 mg LUMC

Versie: 1

Laatste herziening: 01-06-2015 Artikelnummer: 97993964

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?

Dit middel NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het middel in de moedermelk terecht kan komen.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

U mag dit middel niet gebruiken:

- Als u last heeft van nierstenen die bestaan uit urinezuur. De klacht kan verergeren.
- Als u ooit op een eerder gebruik van probenecide overgevoelig reageerde, zoals met galbulten, huiduitslag of jeuk
- Bij bloedafwijkingen
- Bij kinderen jonger dan 2 jaar
- Start niet met dit middel tijdens een jichtaanval. De aanval kan dan juist verergeren. Mocht later Tijdens de behandeling toch een jichtaanval optreden, dan moet u wel doorgaan met het gebruik.
- Als u aan topsport doet. Dit middel wordt gezien als doping, aangezien het het gebruik van andere dopingmiddelen kan maskeren.

Overleg vóór gebruik met uw arts:

- Als u ooit last heeft gehad van nierstenen of als uw nieren minder goed werken.
- Als u ooit een maag- of darmzweer heeft gehad.
- Als u lijdt aan porfyrie. Dit middel kan een aanval uitlokken.

Als u twijfelt of één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Bespreek dit met uw arts of apotheker.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Het werkzame bestanddeel is probenecide. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn siliciumdioxide, colloidaal watervrij geperst cellulose microkristallijn.

Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

24 maanden houdbaar bij kamer temperatuur (15-25) graden Celcius.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en ze komen niet in het milieu.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.