

Preparaat: Placebo Drank LUMC

Artikelnummer: 90090373

Z-index: 17194121

Bijsluiter

Werking en toepassingen

Dit medicijn is een drank met hulpstoffen en kan worden gebruikt bij het afbouwen van dexamethasondrank.

Bijwerkingen

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, al krijgt zeker niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

- misselijkheid, droge mond of hoofdpijn

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

U kunt bijwerkingen daarnaast melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen hier te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe, wanneer en hoelang?

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. U moet dit middel gebruiken bij het afbouwen van andere medicijnen en voor die duur die de arts die heeft aangegeven.

Dosis vergeten of teveel gebruikt?

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, kunt u deze overslaan en verder gaan met de volgende dosis.

Wat u moet doen wanneer u teveel heeft gebruikt?

Wanneer u te veel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts.

Autorijden, alcohol, voeding

1.1 *Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan autorijden?*

Ja, met dit medicijn mag u autorijden of andere voertuigen besturen.

1.2 *Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alcohol drinken?*

Ja, met dit medicijn mag u alcohol drinken.

1.3 *Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan alles eten?*

Er zijn geen beperkingen voor het eten.

Preparaat: Placebo Drank LUMC

Artikelnummer: 90090373

Z-index: 17194121

1.4 Wisselwerking

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft geen wisselwerkingen met andere medicijnen

Zwangerschap en borstvoeding

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben of wil worden?

U kunt dit medicijn zonder bezwaar gebruiken als u zwanger wilt worden.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik borstvoeding geef?

U kunt dit medicijn zonder bezwaar gebruiken als u borstvoeding geeft.

Wanneer niet gebruiken?

Wanneer mag ik dit medicijn niet gebruiken?

Dit medicijn kan alleen gebruikt worden als de arts dit voorschrijft. Er zijn geen situaties waarin u dit geneesmiddel niet mag gebruiken.

Stoppen

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Er zijn geen speciale voorwaarden voor het stoppen met dit medicijn.

Samenstelling

Wat zit er in dit medicijn?

Dit medicijn bevat fosfaat-zouten, dinatriumedetaat, sorbitol, methylparahydroxybenzoaat en bananenessence.

Bewaren

Hoe moet ik het medicijn bewaren?

Dit medicijn moet bewaard worden bij kamertemperatuur. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum; deze is vermeld op het etiket.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Deze tekst is opgesteld door de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT), onderdeel van het LUMC. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is het LUMC niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.